

One Shot Ultra 8



FORMÜLASYONU

Bakterin toksoid. Lyofilize kısım *M. haemolytica* Tip A1, sıvı kısım clostridial antijenleri ve bağışıklık yanıtını arttırmak için Stimugen adjuvantı formalin içerir.



ENDİKASYONLARI

Siğirilerde *Cl. chauvoei* tarafından oluşturulan yanıkara, *Cl. septicum* tarafından oluşturulan malignant ödem, *Cl. haemolyticum* tarafından oluşturulan basiller hemoglobini, *Cl. novyi* tarafından oluşturulan infeksiyöz nekrotik hepatitis, *Cl. sordelli* tarafından oluşturulan gazlı gangren, *Cl. perfringens* Tip B, C, D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritise ve *M. haemolytica* Tip A1 tarafından oluşturulan pnömoniye karşı korumada kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

- Sağlıklı sürülerin aşılması önerilir. Lyofilize kısım ve sıvı kısım karıştırıldıktan sonra iyice çalkalanır ve deri altı 2 ml uygulanır.
- **Primer aşılama:** Sağlıklı siğirlere 2 ml deri altı uygulanır. 4-6 hafta sonra Ultrabac 8/Ultrachoice 8 ile 2 ml booster doz uygulanır.
- **Yıllık aşılama:** Ultrabac 8/Ultrachoice 8'in yıllık bir doz uygulanması önerilir.

UYARILAR

Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır. Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici bir şişkinlik görülebilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 ml'lik şişelerde 10 doz olarak sunulmaktadır.